

PROCEDURY POSTĘPOWANIA w przypadku wystąpienia ataku epileptycznego u ucznia

Napady małe, bez drgawek przebiegają z krótką utratą świadomości. Uczeń nieruchomieje i wygląda, jakby się zamyślił. Często nie zdaje sobie nawet sprawy z przebytego napadu.

W dużych napadach uczeń traci świadomość i może dojść do upadku, pojawiają się drgawki mięśni i kończyn, a potem następuje chwilowy brak reakcji na bodźce.

1. Zachowaj spokój i chroń ucznia przed doznaniem obrażeń
– usuń z jego otoczenia wszelkie przedmioty, które mogą je powodować.
2. Podłóż dziecku pod głowę jakąś część garderoby, a jeśli ma otwarte usta wsadź mu między zęby np. zwiniętą chustkę lub róg ręcznika
– nie wkładaj żadnych metalowych przedmiotów, mogą uszkodzić zęby.
3. Zdejmij uczniowi okulary, rozluźnij kołnierz, pasek u spodni.
4. Po ustaniu drgawek ułóż dziecko na boku, by zapobiec zachłyśnięciu się śliną.
5. Nie podawaj mu żadnych płynów, kropli i tabletek
– nauczycielom nie wolno podawać leków nawet na prośbę rodziców !
6. Mów do ucznia łagodnym, ciepłym głosem.
7. Zaopiekuj się uczniem, monitoruj jego stan
– bezpośrednio po napadzie padaczkowym dziecko może być senne, osłabione i skarżyć się na ból głowy.
8. O wystąpieniu napadu zawsze informuj rodziców ucznia
– to ważne dla przebiegu jego leczenia.

Jeśli drgawki trwają dłużej niż około 10 minut lub gdy uczeń na dłuższy czas traci oddech, należy wezwać pomoc medyczną.

PROCEDURY POSTĘPOWANIA w przypadku wystąpienia epizodu psychotycznego u dziecka

Działania interwencyjne :

- Zaopiekowanie się dzieckiem
– nie wolno zostawiać go samego.
- Reagowanie spokojem, łagodnością.
- Przeprowadzenie bez rozgłosu w spokojne miejsce.

- Na ile to możliwe, nierozpowszechnianie w szkole informacji o zdarzeniu.
 - Zawiadomienie pogotowia ratunkowego
– nie ma na co czekać , rozstrzyganie, czy to jest psychoza, czy nie, należy pozostawić lekarzom.
 - Zawiadomienie rodziców.
- Jeżeli wiemy, że w szkole jest uczeń chory psychicznie należy podjąć działania uprzedzające i naprawcze.

PROCEDURY POSTĘPOWANIA w przypadku ataku dusznicy

1. Należy podać uczniowi wziewnie lek rozkurczający oskrzela zgodnie z pisemnym zaleceniem lekarza.
2. W przypadku ciężkiej duszności dwie dawki leku w odstępie 10– 20 sekund.
3. Jeżeli duszność nie ustępuje, lek można podać dodatkowo po 20 minutach.
4. Gdy nastąpiło duże nasilenie duszności należy wezwać pogotowie ratunkowe.
5. Wezwać rodziców, w czasie oczekiwania na karetkę nie wolno pozostawić ucznia samego
– musi być pod opieką osoby dorosłej.
6. Po ataku uczeń powinien odpocząć, przyjąć dogodną dla siebie pozycję ciała
– nie musi leżeć, może siedzieć i podpierać się rękami.
7. Należy zachęcać do spokojnego oddychania.